



INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA
SOLUCIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: 865
Titular del Registro: SHARDA COLOMBIA S.A.



anasac
COLOMBIA

SHARFENTIURON 25 SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Diafentiuron.....250 g/L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SHARFENTIURON 25 SC, es un insecticida/acaricida no sistémico con excelente acción de contacto y estomacal. Posee alguna actividad ovicida. Tiene actividad translaminar. Su ingrediente activo (Diafentiuron) del grupo químico de las Thioureas, actúa como un inhibidor de el adenosin trifosfato mitocondrial (ATPasa) luego de una activación metabólica de la carbodiimida correspondiente.

SHARFENTIURON 25 SC, actúa por parálisis de los insectos, impidiendo su movimiento, alimentación y daño al cultivo: detiene el daño de la plaga desde el momento de contacto del insecto con el producto.

SHARFENTIURON 25 SC, es ideal para uso en programas de rotación para manejos de la resistencia. Especialmente útil en el manejo de insectos chupadores y ácaros.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ROSA	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 cc/L Utilizar 1200 L de agua/Ha	N.A.	24
HABICHUELA	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1L/Ha Utilizar 300 a 400 L de agua/Ha	14	
TOMATE DE ÁRBOL	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 a 0,7 cc/L	7	
FRESA	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,8 a 0,9 cc/L	14	

P.C.: Periodo de carencia - P.R.: Periodo de reentrada



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **SHARFENTIURON 25 SC**; para cultivo de Rosas cuando aparezcan los primeros individuos en el cultivo y para Habichuela con la aparición de los primeros estados inmaduros, esto dentro de un programa de rotación con insecticidas de diferentes mecanismos de acción.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Aplicación terrestre: Para cultivo de habichuela un volumen de mezcla de 300 a 400 litros/ha. Cultivo de flores un volumen de agua de 1.200 litros/Ha.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA
SOLUCIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: 865
Titular del Registro: SHARDA COLOMBIA S.A.



anasac
COLOMBIA

SHARFENTIURON 25 SC

COMPATIBILIDAD



Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD

SHARFENTIURON 25 SC, no presenta fitotoxicidad de acuerdo con las recomendaciones dadas en esta etiqueta.



PRIMEROS AUXILIOS

- **EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación.
- **INGESTIÓN:** Lavar la boca con agua. Si está consciente, administrar abundante agua e inducir el vómito.

Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

ANTÍDOTO

No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.
- No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua de escorrentía, hacia cultivos susceptibles (soya, algodón, girasol, tomate, etc.)
Establecer franjas de seguridad donde se vayan a sembrar
- cultivos diferentes a aquellos para los cuales está recomendado.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO POR CONTACTO E INGESTION A ABEJAS.
NO APLICAR EN CERCANÍAS DE LUGARES DISPUESTOS COMO APIARIOS.
NO APLICAR EN ÉPOCA DE FLORACIÓN DE LOS CULTIVOS A TRATAR.



EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono
(601) 2886012. Atención 24 horas.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

PRESENTACIONES

1L

