

FICHA TÉCNICA
MANCOZEB 80% WP
FUNGICIDA
Diciembre 2010
INFORMACION GENERAL

Ingrediente Activo:	Mancozeb
Nombre Químico:	Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal de zinc.
Grupo Químico:	Ditiocarbamato.
Concentración:	80% p/p (800 g/Kg)
Formulación:	Polvo Mojable (WP)
Modo de Acción:	Contacto
Fabricante:	UNITED PHOSPHORUS LTD. (India)
Importador y Distribuidor:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile
Toxicidad:	IV (Verde). Producto que normalmente no ofrece peligro.
Antídoto:	No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
Autorización SAG N°:	2620

INFORMACION GENERAL

Fungicida preventivo de amplio espectro, con acción de contacto para control de enfermedades fungosas en Hortalizas, Frutales, Vid, Cereales, Cucurbitáceas y tratamiento de semillas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (g/100 Lt. agua)	OBSERVACIONES
Manzano y Peral.	Sarna (<i>Venturia inaequalis</i>) Corazón mohoso (<i>Alternaria</i>)	180-240 200-240	Aplicar después de una lluvia y repetir cada 7 días hasta caída de pétalos y luego repetir cada 14 días. Aplicar en botón rosado, plena flor y caída de pétalos. Máximo 10 aplicaciones por temporada.
Viñas y Parronales.	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>); Mildiú (<i>Plasmopara</i>).	180 -240	Desde inicio de flor hasta cuaja, en forma preventiva. Máximo 10 aplicaciones por temporada.
Cereales: Trigo, Avena, Cebada y Centeno.	Desinfección de semillas: <i>Fusarium</i> ; <i>Pythium</i> ; <i>Helminthosporium</i> Al follaje: Septoria; <i>Helminthosporiosis</i> .	2,5 kg/ha	Desde el encaño cada 7 a 10 días, con un máximo de 3 aplicaciones.
Cebolla, Ajo, Puerro.	Botritis y Mildiú (<i>B. cinerea</i> y <i>P. destructor</i>)	1,5 a 2,5 kg/ha.	Al presentarse los primeros síntomas. Repetir cada 7 días.
Papa, tomate, ají, pimiento	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>). Antracnosis y botritis.	180-240	Aplicar en plantas de 5 a 15 cm, repetir cada 7 días, según sea necesario. Máximo 10 aplicaciones por temporada.
Lechuga, Repollo, Coliflor, Bruselas, Brócoli.	Tizón; Antracnosis; Mildiú; Alternaria; Pudrición gris.	2,0 a 2,5 kg/ha.	Desde arraigamiento, cada 7 a 10 días. Máximo 10 aplicaciones por temporada.
Almacigueras de Cultivos Frutales y Anuales, Especies Forestales y Ornamentales.	Caída de almácigo y otros problemas fungosos en almacigueras.	Inicialmente 100 g y posteriormente 200 g	Una aplicación por temporada.

Cucurbitáceas	Botritis Alternarioisis Picada de fruto	1,5 -2,5 kg/ha	Aplicar cuando la planta tenga 2 hojas verdaderas, repetir cada 7 días. Máximo 7 aplicaciones por temporada.
Apio	Septoria (<i>Septoria apicola</i>)	180 - 240	Aplicar cada 3 días en almácigo o cada 7 días en trasplante y después de lluvias.
Tabaco.	Antracnosis; Moho azul (<i>Cercospora nicotianae</i>); (<i>Peronospora tabacina</i>)	180- 240 g	Aplicaciones preventivas cada 3 a 5 días, desde que las hojas alcancen 1,5 cm de diámetro en almácigos.
CULTIVO			
ENFERMEDADES	DOSIS L/ha.	OBSERVACIONES	
Trigo, Avena, Cebada y Centeno.	Septoriosis	40 a 60	Desde el encañado cada 7 a 10 días, con un máximo de 3 aplicaciones
PREPARACION DE LA MEZCLA			
Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.			
COMPATIBILIDAD			
Compatible con la mayoría de los pesticidas comunes tales como Azinphos, Carbaryl, Dicofol, Endosulphan, Pirimicarb, Propagrite y agentes humectante.			
INCOMPATIBILIDAD			
No se debe utilizar en combinación con productos alcalinos como caldo bordoles o azufre. Es compatible con sustancias básicas fuertes, sustancias acidas fuertes o materiales oxidantes.			
FITOTOXICIDAD			
No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones. Se aconseja realizar una prueba local, ya que puede haber influencia del clima.			
REINGRESO AL AREA TRATADA			
Personas y animales: Se debe esperar un periodo de resguardo de 12 horas después de la aplicación			
PERIODO DE CARENCIA (DIAS)			
Manzana 21; Peras 15; Trigo 26; Uva de mesa y vinífera 66; Tomate, Ají, Pimiento 5; Cucurbitáceas 5; Cebolla y Ajo 7; Lechuga y Crucíferas 14; papas: 0 días.			

Advertencias: NUFARM CHILE LTDA., sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.